

TEST EN BOMBA

REFRESCA TUS CONOCIMIENTOS

TEST EN BOMBA

1. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ES UNA HIPÓTESIS NULA (H0)?

- a) La ultrafiltración convencional remueve inteleuquina 4 durante la CEC.
- b) La ultrafiltración convencional no remueve inteleuquina 4 durante la CEC.

2. UN ESTUDIO ES SIGNIFICATIVAMENTE ESTADÍSTICO SI:

- a) $P < 0,005$.
- b) $P < 0,5$.
- c) $p > 0,005$.
- d) $p > 0,5$.

3. UN ERROR DE TIPO I EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN:

- a) Falso positivo.
- b) Falso negativo.
- c) Sesgo total.

4. ES CORRECTO DECIR ACERCA DE LA SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA P:

- a) Es la probabilidad de que ocurra la hipótesis nula.
- b) Es la probabilidad de que ocurra la hipótesis verdadera.

5. ESCOJA LA RESPUESTA CORRECTA PARA ESTE ENUNCIADO:

• EVIDENCIA QUE DERIVA DE UN ESTUDIO CLÍNICO ALEATORIZADO Y O ESTUDIOS GRANDES NO ALEATORIZADOS.

- a) Nivel de evidencia C.
- b) Nivel de evidencia B.
- c) Nivel de evidencia A.

6. CUANDO LA EVIDENCIA/ACUERDO GENERAL DE QUE UN DEBIDO TRATAMIENTO NO ES ÚTIL O EFECTIVO O INCLUSO PUEDE CAUSAR DAÑO, DECIMOS QUE LA CLASE DE RECOMENDACIÓN ES:

- a) Clase I.
- b) Clase IIa.
- c) Clase IIb.
- d) Clase III.

7. SON MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL DE LOS DATOS:

- a) OR, intervalo de confianza, porcentaje.
- b) Media, mediana, moda.
- c) Moda, intercuartiles, dispersión.

8. UN ESTUDIO CLÍNICO QUE EVALÚA EFECTIVIDAD SE ENCUENTRA EN QUÉ FASE:

- a) Fase I.
- b) Fase II.
- c) Fase III.
- d) Fase IV.

9. ¿QUÉ PUEDE SUCEDER CON UN MEDICAMENTO O DISPOSITIVO CLÍNICO QUE SE ENCUENTRE EN FASE IV?

- a) Que se modifique su dosis.
- b) Que se sustituya alguna de sus partes fórmula o componentes.
- c) Que sea retirado del mercado.

10. ¿QUÉ ES UN SESGO EN LOS ESTUDIOS CLÍNICOS?

- a) Derivar los resultados hacia otra conclusión o inferencia con o sin intención.
- b) Interrumpir el estudio por futilidad.
- c) Interpretar erróneamente los resultados estadísticos.

RESPUESTAS: 1B; 2A; 3A; 4A; 5B; 6D; 7B; 8B; 9C; 10A.